

# Mistel 100 g

Arzneitee für Erwachsene

Wirkstoff: Mistelkraut, geschnitten



PZN -06145113

**Anwendungsgebiete:** Traditionell angewendet zur Unterstützung der Kreislauffunktion. Dieses Arzneimittel ist ein traditionelles Arzneimittel, das ausschließlich aufgrund langjähriger Anwendung für das Anwendungsgebiet registriert ist. **Gegenanzeigen:** Sie dürfen Mistel nicht einnehmen, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie auf Mistelkraut überempfindlich (allergisch) reagiert haben. **Wechselwirkungen mit anderen Mitteln** wurden bisher nicht untersucht. **Dosierungsanleitung:** Erwachsene trinken 2 bis 3-mal täglich eine Tasse Mistel. **Zubereitung:** Setzen Sie einen gehäuften Esslöffel auf eine Tasse (150 ml) kalt an, lassen diesen 1-2 Stunden unter gelegentlichem Umrühren ziehen und seihen dann ab. Kurz aufkochen lassen und auf Trinktemperatur abkühlen lassen. Zum Einnehmen nach Bereitung eines Teeaufgusses. **Dauer der Anwendung:** Bei Beschwerden unklarer Ursache sollte die Selbstmedikation nach zwei Wochen beendet werden. **Anwendung bei eingeschränkter Nieren-/Leberfunktion:** Für konkrete Dosierungsempfehlungen bei eingeschränkter Nieren-/Leberfunktion gibt es keine hinreichenden Daten. **Anwendung bei Kindern und Jugendlichen:** Eine Anwendung bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren wird nicht empfohlen. **Anwendungsfehler und Überdosierung:** Wenn Sie versehentlich einmal 1 oder 2 Einzeldosen (entsprechend eine Tasse oder zwei Tassen Mistel Tee) mehr eingenommen haben, so hat dies in der Regel keine nachteiligen Folgen. Setzen Sie in diesem Fall die Einnahme so fort, wie es in der Dosierungsanleitung beschrieben ist oder verordnet wurde. Falls Sie dieses Arzneimittel erheblich überdosiert haben, sollten Sie Rücksprache mit einem Arzt nehmen. Wenn Sie zu wenig Mistel eingenommen haben oder die Einnahme vergessen haben, nehmen Sie beim nächsten Mal nicht etwa die doppelte Menge ein, sondern fahren Sie mit der Einnahme, wie von Ihrem Arzt verordnet oder hier beschrieben, fort. **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:** Da keine ausreichenden Untersuchungen vorliegen, sollte Mistel bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren, sowie während Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden. Sie sollten bei fortdauernden Krankheitssymptomen oder beim Auftreten anderer als der unten genannten Nebenwirkungen einen Arzt oder eine andere in einem Heilberuf tätige qualifizierte Person konsultieren. **Nebenwirkungen:** Bisher wurden im angegebenen Dosierungsbereich bei der Einnahme von Mistel keine Nebenwirkungen beobachtet. Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die hier nicht angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden. **Hinweise zu Aufbewahrung und Haltbarkeit:** Dieses Arzneimittel darf nach Ablauf des Verfalldatums, das auf der Packung angegeben ist, nicht mehr angewendet werden. Nicht über 25 °C aufbewahren. Haltbarkeit nach Anbruch: 5 Monate. Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren. **Zusammensetzung, Inhalt und Darreichungsform:** 100 g Arzneitee enthalten als Wirkstoff: 100 g Mistelkraut, geschnitten. Sonstige Bestandteile: keine. **Pharmazeutischer Unternehmer:** SALUS Haus GmbH & Co. KG, Bahnhofstr. 24, 83052 Bruckmühl, [info@salus.de](mailto:info@salus.de).

**Stand der Information:** Juni 2017

Art.-Nr. 01001664 · GTIN 4004148320309 · PZN -06145113

Reg.-Nr.: 76355.00.00

labpal-001-v5-2018-10-mistel

Ch.-B.:

Verwendbar bis:



4 004148 320309