

Alpenkraft® Bronchial-Husten- Sirup

**Zur Anwendung bei Erwachsenen
und Kindern ab 12 Jahren**



Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie, was Sie bei der Anwendung des Arzneimittels beachten sollten.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss BRONCHIAL-HUSTEN-SIRUP jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Indikationsgruppe und Anwendungsgebiete
2. Wichtige Hinweise vor der Anwendung
3. Hinweise zur Einnahme/Anwendung
4. Nebenwirkungen
5. Aufbewahrungshinweise und Haltbarkeit
6. Zusammensetzung und Inhalt der Packung
7. Weitere Informationen

1. Indikationsgruppe und Anwendungsgebiete

Traditionelles pflanzliches Arzneimittel.

Wirkt desinfizierend auf die Schleimhäute der oberen Luftwege; vorbeugend gegen Erkältungskrankheiten wie Husten, Schnupfen, Halsentzündung, Bronchitis und grippale Infektionen.

Anregung der Schleimabsonderung; Vorbeugung gegen Raucherhusten.

Traditionell angewendet zur Unterstützung der Organfunktion.

2. Wichtige Hinweise vor der Anwendung

2.1 Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie BRONCHIAL-HUSTEN-SIRUP nicht einnehmen?

Sie dürfen BRONCHIAL-HUSTEN-SIRUP nicht einnehmen, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Anis, Anethol, Fenchel und Eukalyptus oder einem der sonstigen Bestandteile sind.

2.2 Kinder

Was müssen Sie bei Kindern beachten?

Wegen nicht ausreichender Untersuchungen sollte BRONCHIAL-HUSTEN-SIRUP

bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

2.3 Schwangerschaft und Stillzeit

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln einen Arzt oder Apotheker um Rat.

Wegen nicht ausreichender Untersuchungen sollte BRONCHIAL-HUSTEN-SIRUP in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

2.4 Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Es sind keine Beeinträchtigungen bekannt.

2.5 Wichtige Informationen über bestimmte weitere Bestandteile von BRONCHIAL-HUSTEN-SIRUP:

Dieses Arzneimittel enthält Invertzucker und Sucrose. Invertzucker ist eine Mischung aus Glucose und Fructose.

Bitte nehmen Sie BRONCHIAL-HUSTEN-SIRUP erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

15 ml BRONCHIAL-HUSTEN-SIRUP enthalten 10 g einer Mischung aus Glucose und Fructose, entsprechend ca. 0,9 Proteinheiten (BE). Wenn Sie eine Diabetes-Diät einhalten müssen, sollten Sie dies berücksichtigen.

2.6 Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Keine bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen oder anwenden bzw. vor kurzem eingenommen oder angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

3. Hinweise zur Einnahme

3.1 Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt BRONCHIAL-HUSTEN SIRUP nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Dosierungsanleitung, da BRONCHIAL-HUSTEN-SIRUP sonst nicht richtig wirken kann!

Bitte vor Gebrauch schütteln.

Dosierung:

Für die Packungsgrößen 100 ml, 250 ml, 500 ml:

Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren nehmen 3- bis 5-mal täglich 15 ml mit dem beiliegenden Messbecher ein und lassen BRONCHIAL-HUSTEN-SIRUP vor dem Hinunterschlucken langsam im Mund zergehen.

Für die Packungsgröße 15 ml:

Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren nehmen 3- bis 5-mal täglich den Inhalt eines Fläschchens (15 ml) ein und lassen BRONCHIAL-HUSTEN-SIRUP vor dem Hinunterschlucken langsam im Mund zergehen.

Die Anwendung bei Kindern unter 12 Jahren ist nicht vorgesehen.

Art der Anwendung:

Zum Einnehmen.

Dauer der Anwendung:

Unbegrenzt.

Bei Fragen zur Klärung der Dauer der Anwendung fragen Sie bitte den Arzt oder Apotheker.

Hinweis für Diabetiker:

15 ml entsprechen ca. 0,9 BE.

3.2 Überdosierung und Anwendungsfehler

Wenn Sie eine wesentlich größere Menge BRONCHIAL-HUSTEN-SIRUP eingenommen haben als Sie sollten:

In der Regel hat dies keine nachteiligen Folgen. Möglicherweise treten die unten aufgeführten Nebenwirkungen verstärkt auf.

Wenn Sie die Einnahme von BRONCHIAL-HUSTEN-SIRUP vergessen haben:

Nehmen Sie beim nächsten Mal nicht etwa die doppelte Menge, sondern führen Sie die Anwendung, wie in der Dosierungsanleitung beschrieben, fort.

4. Nebenwirkungen

Wie alle Arzneimittel kann BRONCHIAL-HUSTEN-SIRUP Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Mögliche Nebenwirkungen:

Wegen des Gehaltes an Anis, Fenchel und Eukalyptusöl sind in Einzelfällen

allergische Reaktionen der Haut und der Atemwege möglich.

Meldung von Nebenwirkungen:

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Aufbewahrungshinweise und Haltbarkeit

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel (Umkarton) und dem Behältnis (Etikett) angegebenen Verfalldatum (Datum nach „verwendbar bis“) nicht mehr verwenden.

Nach Anbruch gut verschlossen, kühl und dunkel aufbewahren.

Haltbarkeit nach Anbruch:

Mind. 4 Wochen

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Nicht über 25 °C lagern.

6. Zusammensetzung und Inhalt der Packung

100 g Sirup enthalten als Wirkstoffe:

0,056 g	Latschenkiefernöl
0,012 g	Bitterfenchelöl
0,012 g	Sternanisöl
0,007 g	Eukalyptusöl
15,100 g	wässriges Destillat (1:12,9) und
18,300 g	wässriger Auszug (1:15,7)
	aus
0,600 g	Thymian
0,131 g	Lindenblüten
0,116 g	Schlüsselblumenblüten
0,095 g	Anis
0,095 g	Bitterem Fenchel
0,085 g	Sonnentaukraut
0,042 g	Vogelknöterichkraut

Sonstige Bestandteile:

Süßholzwurzel, gereinigt, Honig, Malzextrakt, Sucrose, Natriumalginat, Natriumpyrophosphat, Tricalciumphosphat, Zitronenöl, Pfefferminzöl, Wasser

Inhalt und Darreichungsform:

Packung mit 15 ml, 100 ml, 250 ml und 500 ml Sirup.

7. Weitere Informationen

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

SALUS Haus GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 24
D-83052 Bruckmühl
info@salus.de

Diese Information wurde zuletzt überarbeitet im Oktober 2015.